

Vakcíny pro kočky aneb co se rozumí pod pojmem „zvíře je v imunitě“
pro účely VÝSTAVY PRO KOČKU, podzimní umístovací výstavy opuštěných koček,
která proběhne v neděli 11. listopadu 2012 na Chvalské tvrzi.

Protože na výstavě u veterinární přejímky neradi odmítáme zvířata, jejichž vakcinace se neshoduje s veterinárními podmínkami, připravili jsme pro vás seznam vakcín používaných pro kočky spolu s údaji, za jak dlouho po aplikaci vakcíny nastupuje imunita proti očkováním nemocem.

Zkonzultujte, prosím, záznamy v očkovacích průkazech svých zvířat s níže uvedenými údaji, a na výstavu berte pouze zvířata s vyhovující vakcinací. Používá-li Váš veterinární lékař jiné vakcíny, než jsou zde uvedené, vyžádejte si příbalový leták.

Biofel PCH, Biofel PCHR

Kočky se vakcinují od 8 - 10 týdnů stáří vakcínou Biofel PCH. Revakcinuje se v intervalu 3 - 4 týdnů po primovakcinaci vakcínou Biofel PCHR.

Protektivní **imunita nastupuje za 2 – 4 týdny po revakcinaci** a přetrvává rok.

Felocel CVR

Kočky mladší 9 týdnů revakcinovat každé 3 - 4 týdny až do věku 12 týdnů. Kočky ve věku 9 týdnů a starší: 2 dávky v rozmezí 3 – 4 týdnů.

Imunita nastupuje 2 týdny po druhé aplikaci a přetrvává rok.

Nobivac Tricat

Primovakcinace od věku 9 týdnů, revakcinace za 3 - 4 týdny.

Plná postvakcinační **imunita se vyvine do 7 dnů po revakcinaci** a přetrvává rok.

Nobivac Forcat

Primovakcinace ve věku 8 - 9 týdnů, revakcinace ve věku 12 týdnů.

Plná postvakcinační **imunita se vyvine do 7 dnů po revakcinaci**.

Purevax PCH

Primovakcinace: první injekce od stáří 8 týdnů, druhá injekce o 3 - 4 týdny později.

Nástup imunity 4 týdny po základní vakcinaci, tzn. po druhé injekci,
imunita přetrvává rok.

Quadricat

Primovakcinace od 3 měsíců stáří zvířete; 1 měsíc před nebo 1 měsíc po vakcinaci vakcínou Quadricat se aplikuje vakcína Purevax PCH.

Nástup imunity je za 2 - 4 týdny po vakcinaci a ochrana přetrvává po dobu jednoho roku.

Rabisin

Imunita za 2 - 3 týdny po vakcinaci a přetrvává po dobu 12 - 36 měsíců.

Nobivac Rabies

Imunita nastupuje do 3 týdnů po vakcinaci a přetrvává 3 roky.